



#juntos
macnab

CÓMO ACTUAR ANTE UN CASO SOSPECHOSO

Temperatura
de 37.5° o más.



Tos.



Dolor de
garganta.



Dificultad
respiratoria.



Pérdida repentina
de olfato y/o gusto.



Dolor de cabeza.



Dolor muscular.



Diarrea y/o vómitos.



Síntomas compatibles COVID-19



#juntos
macnah

CASO 1

Caso sospechoso (estudiante o docente) que presenta 1 o más síntomas.

Si pertenece a una burbuja

Se deberá aislar y testear a la persona, aislar preventivamente a los/as que conforman esa burbuja y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de los síntomas, hasta tanto esté el resultado.



Resultado

1. De ser negativo, con constancia del resultado y constancia de evaluación médica de alta, puede restituirse a la escuela y se reactiva la burbuja.
2. De ser positivo, todas las personas relacionadas con la burbuja inicialmente aislada, deberán completar el aislamiento estricto durante 10 días desde el último contacto con el caso positivo de COVID-19.

Si no pertenece a una burbuja

Se deberá proceder a aislar al caso sospechoso así como también a aquellas personas que hayan tenido contacto estrecho de alto riesgo en el marco de las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso.



Resultado

1. De ser negativo, podrá restituirse a las actividades presenciales con constancia de resultado y certificado de evaluación médica de alta.
2. De ser positivo deberá cumplimentar con el aislamiento por 10 días desde el inicio de los síntomas.

Si presenta síntomas durante la jornada escolar

Estudiante: aislarlo/a en sala de aislamiento y llamar a la familia para que lo retire e indicar evaluación médica.

Personal docente/no docente: se retira de la institución, procede a la evaluación de salud y tramita la licencia correspondiente.



Resultado

1. De ser negativo, con constancia del resultado y constancia de evaluación médica de alta, puede restituirse a la escuela y se reactiva la burbuja (si fue aislada).
2. De ser positivo deberá cumplimentar con el aislamiento por 10 días desde el inicio de los síntomas.

CASO 2

Caso confirmado

(estudiante o docente)

Si pertenece a una burbuja

¿A quiénes?

Se aísla a esa persona, a la burbuja y a quienes hayan tenido contacto estrecho 48 horas antes del inicio de síntomas o si es asintomático desde el día que se realizó la PCR.

¿Cuánto tiempo de aislamiento?

Durante 10 días desde el último contacto con el caso positivo de COVID-19.

Si no pertenece a una burbuja

Se aísla a esa persona por 10 días y a quienes hayan tenido contacto estrecho de alto riesgo en el marco de las 48 horas previas al inicio de los síntomas del caso o, si es asintomático/a, desde el día que se realizó la PCR.

CASO 3

Contacto estrecho

(CE) (estudiante o docente)

Si pertenece a una burbuja

Se aísla únicamente a la persona que es contacto estrecho de un caso confirmado por el término de 10 días. Cuando el caso confirmado forma parte de un grupo familiar que no puede separarse para cumplimentar el aislamiento, se considera como 1º día de aislamiento del contacto estrecho al último día de aislamiento del último caso confirmado del grupo familiar. A partir de entonces se comienzan a contabilizar los 10 días de aislamiento del contacto estrecho.

Si no pertenece a una burbuja

Se aísla a la persona, la cual deberá cumplimentar con el aislamiento indicado.

